



Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE 8 – AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA
Via Monsignor Giovanni Ferro, 1– 89127 Reggio Calabria

AVVISO
SI RENDE NOTO IL COMUNICATO
DEL GRUPPO MICOLOGICO CALABRO APS “N.CAPITO”

Comunicato per i raccoglitori di funghi.

Visto che vi è stata una fioritura abbondante di *Clorophyllum molybdites* specie tossica confondibile con specie commestibili come la più conosciuta e ricercata *Macrolepiota procera* (mazza di tamburo). Visto la segnalazione di alcuni casi di intossicazione causati da *Clorophyllum molybdites* del Ministero della salute, in Sicilia, Puglia e Calabria nel Comune di Siderno (RC), il Gruppo Micologico di Roccella Jonica (RC) invita tutti i raccoglitori di funghi nel territorio della Città Metropolitana di (RC) e di far visitare tutti i funghi raccolti presso le ASP e Gruppi Micologici del proprio territorio.

Caratteristica: **cappello** da 6 a 12-14 cm da subgloboso a piano-convesso a maturità; superficie bruno-grigiastro, ricoperta da squame con colori, irregolari e sempre più rade, sottili al margine tomentoso e biancastro. **Lamelle:** da giovane bianche poi grigio verdastre. **Gambo:** 5-12x1-2 cm, cilindrico, liscio, con bulbo \pm evidente alla base, biancastro al di sopra dell'anello, bruno rossastro nella parte inferiore. **Anello:** a margine doppio, bianco-grigiastro bordato di bruno. **Carne:** bianca, rosso-arancio \pm intenso alla sezione, senza odore particolare. **Habitat:** parchi, giardini, in terreni coltivati, nelle serre; estate autunno.

Si confonde con altre *Macrolepiota* tossiche; *rachodes*, *venenata*, con carne arrossante e *M. puellaris* non comm. carne immutabile.

Macrolepiota commestibili, confondibili:

Macrolepiota procera: cappello 15-30 cm; da giovane globoso-ovoidale a convesso-spianato con umbone centrale ottuso, carnoso, superficie con squame concentriche di colore bruno-nocciola su fondo biancastro, margine frangiato, cotonoso. **Lamelle:** bianche, fitte, larghe, libere al gambo con collarium, con qualche foratura, separabili dalla carne del cappello. **Gambo:** 15-30 (40) x 1,5-2 cm; cilindrico con un grosso bulbo alla base, attenuato in alto, duro, fibroso, ornato da zigrinature trasversali irregolari al disotto dell'anello, di colore brunastre su fondo biancastro, cavo al taglio. **Anello:** alto, ampio, doppio, scorrevole sul gambo, bianco nella parte superiore, brunastro in quella inferiore, margine frangiato, fioccoso. **Carne:** bianca, fragile nel cappello, fibrosa nel gambo; odore di nocciola, sapore gradevole.

Habitat: cresce nei prati, campi, sentieri di boschi di latifoglie e aghifoglie.

Macrolepiota konradii: le caratteristiche si differenziano poco dalla precedente per il cappello di 10-15 cm di diametro; Lamelle: biancastre; Gambo: 10-15x1-1,5 cm, di colore chiaro e liscio in alto, decorato da sottili squamule evidenti e concolori al cappello verso la base. Anello: semplice, alto, ampio, di colore bruno nella parte inferiore. Carne: biancastra, debolmente rosata nel gambo; odore e sapore gradevoli.

Habitat: cresce nei prati, parchi, in terreno erboso.

Foto fungo tossico *Clorophyllum molybdites*

